
療養保健

天氣轉涼當心中風——從古今觀點認識中風先兆


JURGAL/ADOBE STOCK

文｜葉慧昌
（葉慧昌中醫診所院長）

腦中風患者往往有血脂肪偏高、動脈硬化、血壓異常等心血管疾病。由於平日疏忽，遽然發生腦出血或栓塞的意外，導致肢體麻痺、半身不遂，甚至因而死亡的悲劇，不但是病人的痛苦及家屬的負擔，更是社會的嚴重損失。


STUDIO ROMANTIC/ADOBE STOCK

▲ 腦中風並非無跡可循，平時多留意自身狀況，提早治療，就可以擺脫其夢魘。

眾所周知，血脂肪增加，容易發生動脈硬化。當血管壁因膽固醇或三酸甘油酯的長期沉積形成血栓，使血液滯礙難通，倘若血栓脫落，阻塞腦部細小血管，則造成腦栓塞；倘若動脈硬化的人再加上高血壓，也就是血液流經血管時對管壁造成強大壓力，就容易腦出血。尤其在寒冬季節裡，氣溫驟降，人體的交感神經興奮性增高、心跳加快、血管收縮緊張、血液黏稠度增高，這些血管彈性差、血壓不穩定的人，往往會經不起考驗，因而發生腦中風。

一、認識中風先兆

其實，腦中風雖然可怕，並非無跡可循，只要平時多留意自身的狀況，提早治療，還是可以擺脫其夢魘的。茲就常見的「中風先兆」分述於下：

（一）遠期先兆

❶ **記憶障礙：**以健忘、記憶力減退、注意力不集中為特徵，主要為頸內動脈供血不良，形成大腦皮層額葉慢性缺血缺氧所致；中醫認為是痰瘀阻絡，導致腦髓空虛、腦脈氣血不運之故。


❷ **感覺異常：**以四肢麻木，尤其手指麻為最常見，有的則會頭皮麻木，主要是大腦中動脈供血不良所致；中醫認為是痰瘀阻絡、氣血失運之故。

❸ **異常動作：**以頭搖、暈眩、肌肉顫動、口角撮動、眼皮跳動為常見；中醫認為是風陽上擾肝風欲動，故謂「諸風掉眩皆屬於肝」。

上述症狀屬中風遠期先兆，可發現於腦中風前數月至數年。金朝醫家劉完素曾提出中風的遠期先兆為3年，他說：「中風者具有先兆之證，凡人覺大拇指及次指麻木不仁，或手足不用或肌肉蠕動者，3年內必有大風。」可見古人早已觀察入微。

中風發病前夕往往會出現頭痛、噁心、眩暈、行走跌跰等先兆。▼

KRAKENIMAGES.COM/ADOBE STOCK



（二）近期先兆

❶ **眩暈、頭昏：**這是中風常見的先兆之一，中醫認為是痰濁上壅，瘀阻脈絡，或上盛下虛、肝風欲動所致。

❷ **一過性失語、失明、神志喪失：**可因供養腦血液的頸內動脈、大腦中動脈硬化，管腔高度狹窄，或血管收縮，導致大腦皮質短暫性缺血而出現上述症狀；中醫同樣是認為腦絡高度瘀阻，致腦海失養之故。上述近期先兆可發生於中風前數日至數月。

（三）前夕先兆

❶ **嗜睡、昏矇：**精神萎靡、昏昏欲睡，這是由於腦絡高度瘀阻、血行失運之故，現代醫學認為是由於椎底動脈管腔狹窄，供血不良所致，為腦血栓形成前期，這是中風的較近先兆。

❷ **頭痛、噁心、眩暈：**頭痛由不定性變為持續性，部位亦由不定變為固定。有的比較劇烈，甚至噁心、眩暈；中醫認為是肝陽上亢，肝風升動，上擾清空，乃禍不旋踵之兆，為出血性腦中風的信號，此為腦血管高壓，管壁緊張之極，腦血管破裂的前兆。

❸ **頻發四肢麻木、行走跌跰：**由於腦絡高度瘀阻、氣血不運，遠端供血不良所致，常出現於缺血性腦中風，腦血栓形成的前夕。上述先兆可發生於中風前數小時至數日。

二、中風先兆的防治

凡是有血脂肪偏高、動脈硬化、血壓異常者，宜隨時注意病情的控制，若是又有前述中風先兆，更需提高警覺。透過藥物治療、生活及飲食的調適，加強防治，以免不測。

（一）中醫藥的治療

如前所述，缺血性腦中風先兆多半是痰瘀阻絡造成，故其治療原則為化瘀通絡、豁痰瀉濁。如溫：膽湯、血府逐瘀湯都是常用的方子；澤瀉、膽南星、三七、丹參、桃仁、紅花、水蛭都是常用的藥物。運用這些方藥，可改善血濁、血瘀的情況。

若是出血性腦中風先兆，伴有高血壓者，則多半是肝陽上亢、肝風欲動之證，故其治療原則為滋水涵木、平肝潛陽，並兼以豁痰熄風，方能避免中風的來臨。常用的方子，如：鎮肝熄風湯、滋水清肝飲、天麻鉤藤飲等；常用的藥物，如：柴胡、白芍、生地、丹皮、夏枯草、石決明、牡蠣等。運用這些方藥，可改善血壓及常見的神經症狀。

（二）白果葉的輔助治療

白果葉，即銀杏葉，是公孫樹科植物銀杏之乾燥葉。依照古書記載，有斂肺、平喘、止痛的功效，用於肺虛咳喘、胸悶心痛等證。但根據現代醫學的研究，因其含有黃酮類成分，能擴張冠狀動脈及腦動脈，改善心、腦血液循環，降低血清膽固醇、鬆弛支氣管，故近年來用以治療冠心病心絞痛、高血壓、高脂血症及腦血管痙攣等病，取得滿意的效果。此外，也有人用來治療耳鳴、暈眩、腦中風、記憶力減退及防止老化。

故對於曾經罹患中風或有中風傾向者，常會覺得手腳發麻，運用白果葉治療，能防止腦血流阻塞，有利缺血組織中有毒物質的排除。白果葉應用在腦部循環的改善及腦中風的防治，最是常用，西藥並有以之提煉，用來防治中風的。但臨床上並非以白果葉生品煎熬飲用，而是以高濃度濃縮提煉之製劑治療，而且都配合了其他中藥辨證處方合併使用，方見療效。

（三）生活的調適

情緒上不宜太過憂思悲恐，切忌暴怒，以防氣火上沖；不論腦力或體力勞動均不宜過度，避免一口氣工作很久。俗話說「寒冬中風多」，入冬驟然氣溫下降可誘發中風，故病人宜特別重視保暖防寒，切忌手足受凍，尤其清晨5、6點正是中風發病率最高的「奪命時刻」，更應添加衣物。有外出運動習慣者，最好先吃些食物果腹，並做好暖身運動再外出。

再者，中年以上應節制性生活，防止因房事過度而傷腎陰，水不濟火而誘發中風。有高血壓的人，最好不要睡棉花或鴨絨枕，否則睡醒容易頭昏，如果能改睡內充綠豆，或加些野菊花和軟的通草的枕頭，會比較舒服。

（四）配合定期檢查

對於動脈硬化，中醫脈診頗有價值，尤其寸口脈的硬度對動脈硬化的發展可供觀察與評估。脈管硬者，血脂肪幾乎長年偏高，通過一定的防治後，寸口脈的硬度可有相應改善。出現中風先兆後，除用中醫傳統的望、聞、問、切加強觀察外，並應積極配合現代醫學的偵測，如：血脂肪分析、心電圖、X光、超音波等檢查，以便及時治療。

（五）飲食控制

飲食應以清淡為宜，切忌貪吃肥甘厚味、暴飲暴食、嗜酒酗酒。可多吃高纖維食物，如：紅豆、黃豆、玉米、紅蘿蔔、蘋果、梨子、綠葉蔬菜及糙米飯等，不僅可以刺激腸胃蠕動，減少脂肪吸收，還能降低膽固醇，吸附體內的鈉化物排出，抑制血壓上升。

預防動脈硬化，可多吃些新鮮的海苔、海帶、紫菜和干貝；茄子、芹菜和番茄則能降血壓；血壓高又痰多肥胖者，宜多吃海蜇皮、蓮藕和荸薺；但若是血壓偏高又體虛頭昏，老是腿軟無力，則食用富含蛋白質且能軟化血管的海參、干貝，以及淡菜較合適。

（六）中醫保健方法

脂肪與雜質多的血管，會影響血管彈性及血流順暢，不少中藥具有降低血脂肪的功能，可以改善血液循環，如：澤瀉、山楂、何首烏、黑芝麻、草決明、黃精、茵陳等，均被證實有降血脂的效果。因此，平日以山楂加水煮後，放入冰糖當茶飲用，可以擴張血管、利尿和降低膽固醇；山楂也可以和何首烏同煮，多了養血和通便的效果；高血壓輕微的人可以用乾菊花泡茶喝，或者再加些枸杞同煮服用；草決明也有降壓和通便的效果，一般煮後涼飲，或加些菊花、麥冬一同飲用。

清代名醫沈金鰲說：「若風病既愈，而根株未能悉拔，隔1、2年或數年必再發，發則必加重，或至喪命。」這就是說，中風病容易復發，而復發時病情必然加重。所以，曾經罹患過中風的人，其平時的養生保健，也是跟上述有動脈硬化、高血壓、中風先兆的人一樣，必須格外注意，否則這顆定時炸彈可能隨時引爆，到時候，神志昏迷、言語不清、口角歪斜、半身不遂等症狀，將會如排山倒海而來，對病人與家屬而言，都是後悔莫及的！

（本文經作者授權刊載，轉載本文請取得作者同意）

食療養生

蓮藕的20種用法 可養生醫病

文｜溫嬪容
（明慧中醫診所院長）

蓮藕可以止血、補氣血、固精氣、強筋骨、安心神，《本草綱目》稱蓮藕為「靈根」。

蓮藕具有補氣血、固精氣、強筋骨、安心神等多重功效。▼


MDMASUD/ADOBE STOCK

蓮藕的簡單食療妙用

1. 遠視
藕、芹菜、小黃瓜各等份，加入檸檬汁15c.c.、水150c.c.打汁。

2. 酒糟鼻
藕半斤燉熟，加紅糖。

3. 耳鳴
藕、黑芝麻、豬肉各適量，煮湯。

4. 養心安神
藕7兩、蓮子3兩、龍眼乾1兩，煮粥或湯。

5. 老人血瘀
藕粉1兩、核桃3兩，用開水沖泡，加些糖。

6. 降血糖
藕3兩、鱔魚1條，燉湯。

7. 夏季除溼熱
藕半斤、綠豆3兩、薏苡仁3兩、米3兩，煮粥，可加糖。

8. 肺結核咳嗽
藕3兩打碎，加薑汁、鹽、白糖。

9. 久咳
枸杞1兩、紅棗5枚、薑2片，水煮30分鐘；2匙藕粉用開水調勻，加入前湯，再煮5分鐘。

10. 生津止咳
藕、甘蔗各適量，打汁喝。

11. 醉酒
藕打汁頻服。

12. 吐血
鮮藕節搗汁飲。

13. 胃潰瘍
藕節內入蜜，蓋上節，蒸20分鐘，吃藕，喝其湯汁。

14. 健胃
藕和枸杞以2：1比例煮湯。

15. 促進食慾
藕節1節，加酒、鹽、糖、醋、油、蔥花、胡椒炒。

16. 中暑上吐下瀉、腹痛
生藕打汁頻服。

17. 勞倦損脾、大便下血
用藕節研末後，加入人參、白蜜煎湯送服。

18. 舒肝利膽
藕、綠豆各適量煮湯。

19. 強腎
藕1節、黑米3兩，先浸泡1小時，蒸熟後加糖。

20. 產後餘血上沖
藕適量煮汁服。